

المضادات الحيوية الفموية فعالة لعلاج التليف الكيسي



وجدت دراسة كبرى بقيادة خبراء من بريستول ونوتنجهام أن المضادات الحيوية عن طريق الفم لها ذات فعالية المضادات الحيوية التي تعطى عن طريق الوريد، للقضاء على الجراثيم الشائعة التي تسبب مضاعفات خطيرة لدى مرضى التليف الكيسي.

تناولت الدراسة فاعلية نوعي العلاج في معالجة البكتيريا المسببة للتليف الكيسي، تستخدم المضادات الحيوية الوريدية بشكل شائع للقضاء على العدوى، ولكن حتى الآن لم يكن هناك دليل علمي واضح على أن العلاج عن طريق الوريد أفضل من العلاج عن طريق الفم. وأظهرت التجربة أن الاستخدام الروتيني للمضادات الحيوية عن طريق الوريد للقضاء على تلك البكتيريا غير مبرر.

يرى الباحثون أن هذه النتائج (فاعلية المضادات الحيوية الفموية) ربما تقلل من الوقت الذي يقضيه المريض بالمستشفى، حيث يضطر هو وعائلته إلى أخذ إجازة من العمل والمدرسة، وسيؤدي هذا في النهاية إلى تحسين نوعية الحياة للعديد من الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

