

مزيج دوائي يقلص فترة التعافي من كوفيد- 19



كشفت نتائج تجربة أن باريسينيب جنباً إلى جنب مع ريمديسفير يقلصان من وقت الشفاء لمرضى كوفيد-19 المتواجدين بالمستشفيات؛ وذلك من 8 إلى 7 أيام. كان تقليص وقت التعافي من المرض أكثر أهمية في حالة المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين أو التنفس الصناعي. تم نشرت الدراسة في «مجلة نيوانجلاند للطب»، وسعى الباحثون من خلالها لمعرفة تأثير الدواءين المتوفرين بالفعل؛ حيث يستخدم باريسينيب لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وريمديسفير كعامل مضاد للفيروسات. وجد الباحثون أن استخدام ريمديسفير مع باريسينيب أفضل من استخدام الأول وحده؛ وذلك فيما يتعلق بتقليص وقت الشفاء وتسريع التحسن في الحالة السريرية، لا سيما بين المرضى الذين يتلقون الأكسجين عالي التدفق أو التنفس الصناعي. من تلقوا الدواءين معاً تقلصت مدة تعافيتهم من المرض بنحو يوم واحد في المتوسط.