

## أعراض الوباء أكثر ظهوراً بالمدخنين



توصلت دراسة حديثة إلى أن التدخين مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأعراض «كوفيد-19»، ومن المرجح أن يحتاج المرضى المدخنون للذهاب إلى المستشفى أكثر من غير المدخنين. قام بالدراسة باحثون من كوليغ كينج في لندن، ونشرتها مجلة «الصدر».

قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بعدد كبير من الناس، 11٪ منهم من المدخنين. في حين أبلغ أكثر من ثلث المستخدمين عن عدم شعورهم بصحة جيدة خلال فترة الدراسة (24 مارس/آذار وإبريل/نيسان 2020)، كان المدخنون الحمى: COVID-19 الحاليون أكثر عرضة بنسبة 14 ٪ لتطور ثلوث الأعراض المعروفة الذي يشير إلى تشخيص والسعال المستمر وضيق في التنفس؛ وذلك بالمقارنة بغير المدخنين.

كان المدخنون الحاليون أيضاً أكثر عرضة للأعراض الشديدة مقارنة بغير المدخنين؛ فقد أبلغ 29٪ منهم عن أكثر من 5 أعراض مرتبطة بالمرض، و 50٪ عن أكثر من 10 أعراض، بما في ذلك فقدان حاسة الشم أو الإسهال أو التعب أو الارتباك أو آلام العضلات. تشير الأعراض الأكثر إلى حدة المرض.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2026.