


سرطان الغدة مرتبط بالتعرض لعوامل داخل الرحم



أظهرت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة بيرغن، أن سرطان الغدة الدرقية مرتبط بالتعرض منذ أن كان المريض جنيناً داخل رحم أمه. عوامل الخطر القابلة للتعديل لسرطان الغدة الدرقية، هي تعرض الأطفال للإشعاع المؤين والسمنة، وقد تم حتى الآن تحديد عدد قليل من عوامل الخطر داخل الرحم وفي الطفولة المبكرة. أجرى الفريق دراسة متداخلة للحالات والشواهد باستخدام بيانات التسجيل، واشتملت الدراسة على 2437 حالة سرطان غدة درقية، و24,362 حالة تحكم مطابقة، وتتراوح أعمار المشاركين بين 0 و48 عاماً خلال الفترة ما بين عامي 1967 و2015.

حالات الغدة الدرقية الحميدة لدى الأمهات مثل قصور الغدة الدرقية وفرط نشاطها، وتضخمها، والأورام الحميدة لها، كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمخاطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في الأبناء. كما ارتبط ارتفاع الوزن عند الولادة وقصور الغدة الدرقية الخلقي، وتاريخ الأم لمرض السكري، ونزيف ما بعد الولادة بزيادة المخاطر.

