

رجل أو امرأة لا يشكل عاملاً للسكتة الدماغية



يُظهر تحليل البيانات المتعلقة بمرضى عولجوا من السكتة الدماغية، عدم وجود تفاوت في النتائج بين الرجال والنساء؛ ما يعني أن النوع، رجلاً كان أو امرأة «لا يشكل عامل خطر للإصابة بالمرض». أشارت دراسات مختلفة إلى أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالسكتة الدماغية، وقد يكون لهن نتائج ضعيفة بعد الإصابة. تتمتع النساء بعمر افتراضي أطول من الرجال، وبالتالي من المحتمل أن يكون لديهن خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء قد يكون لديهن معدل وفيات أعلى بعد السكتة الدماغية، ومع ذلك فإن الجنس ليس عامل خطرٍ مستقلاً لجميع أسباب الوفيات، كما أن تكرار السكتة الدماغية الإقفارية والنتيجة المركبة لتكرار السكتة الدماغية أو الوفاة لم تظهر أي دليل على وجود تفاوت بين الجنسين. تم نشر الدراسة بمجلة «التطورات العلاجية في الاضطرابات العصبية».

