الخليج

الصحة ,

10 أبريل 2021 22:08 مساء

العلاج المبكر بالحقن يحمي الشبكية



أسهم العلاج المبكر بالحقن المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية إلى إبطاء اعتلال الشبكية السكري، في إحدى الدراسات السريرية، وبعد عامين من الدراسة التي استمرت على مدى 4 أعوام، كان تأثيرها في المقدرة على الرؤية مشابهاً للعلاج القياسي الذي يبدأ عادةً بعد تطور المرض.

يقول الباحثون القائمون بتلك الدراسة، والتي نشرتها المجلة الصادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية، إنه في حين من الممكن أن يساعد ذلك لحقن في حماية حاسة البصر على المدى الطويل لم تتم ملاحظة أي تأثير فيها في غضون عامين. تشير هذه النتائج التي تصل مدتها لسنتين إلى أن المراقبة الدقيقة والعلاج الروتيني عند حدوث المضاعفات هما المفتاح لمنع فقدان البصر من اعتلال الشبكية السكري.

على الرغم من عدم ملاحظة أي اختلاف في نتائج الرؤية في غضون عامين إلا أن المتابعة لمدة 4 أعوام ستكون مهمة؛ لذلك يتطلع الباحثون إلى جمع بيانات الـ4 أعوام مجتمعة لمعرفة ما إذا كان تقليل معدلات اعتلال الشبكية السكري التي تزداد سوءاً ستؤدي إلى فترة طويلة من تحسن الرؤية.

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©