


دراسة تؤكد العلاقة بين المضادات الحيوية وسرطان القولون



هناك ارتباط واضح بين تناول المضادات الحيوية وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون في غضون السنوات الـ 5 إلى 10 التي تلي ذلك. تم تأكيد العلاقة من قبل باحثين في جامعة أوميو بالسويد بعد دراسة 40000 حالة سرطان، ويُعتقد أن السبب هو تأثير المضادات الحيوية في ميكروبيوم الأمعاء.

وجد الباحثون أن كلاً من النساء والرجال الذين تناولوا المضادات الحيوية لأكثر من 6 أشهر معرضون للإصابة بـ «سرطان القولون الصاعد» بنسبة 17٪، وهو الجزء الأول من القولون الذي يصله الطعام من الأمعاء الدقيقة، ولم يتضح خطر متزايد للإصابة بالسرطان في «القولون النازل».

من ناحية أخرى لم يكن هناك خطر متزايد للإصابة بسرطان المستقيم لدى الرجال فيما انخفض الخطر بشكل طفيف لدى النساء اللاتي تناولن تلك العلاجات.

تؤكد النتائج حقيقة أن هناك العديد من الأسباب لتقييد استخدام المضادات الحيوية وعدم وصفها إلا في الحالات

الضرورية، لمنع تطوير البكتيريا المقاومة لها وأيضاً لأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون في المستقبل بحسب ما تبين من الدراسة الحالية.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.