

## خبراء «الصحة العالمية» يؤيدون تلقي جرعة ثانية معززة من لقاح «كوفيد-19»



جنيف - أ ف ب

أوصى خبراء منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص الأكثر تعرضاً لفيروس كوفيد-19 جرعة ثانية معززة لتعزيز مناعتهم.

وأعلنت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بسياسة التلقيح أنه بعد التطعيم الأولي الذي يتكون عادةً من جرعتين وجرعة أولى معززة، يتوجب على مجموعات محددة من الأشخاص تلقي جرعة إضافية.

وقال يواكيم هورنباخ المستشار الصحي الرئيسي لدى منظمة الصحة للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي افتراضي «نقوم بذلك استناداً إلى الملاحظات المتعلقة بضعف الحصانة لا سيما بالنسبة للمتحوّرة أو ميكرون

وأوصت منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى جميع البالغين جرعة معززة بعد أربعة إلى ستة أشهر من اللقاحات الأولية والتي تشمل أيضاً جرعتين.

لكن أليخاندر و كرافيو توتو شدد على أن التوصية بتلقي هذه الجرعة الثانية تتعلق فقط «بالأشخاص الأكثر عرضة للفيروس».

«وقال «لا تشكل توصية عامة لتطعيم جميع البالغين بعد أول جرعة معززة

اعتبرت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بسياسة التلقيح أنه ينبغي اقتراح الجرعة الثانية المعززة للمسنين وجميع من يعانون نقص المناعة والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والكلى

وقال كرافيو توتو إن العاملين في مجال الرعاية الصحية من جميع الأعمار يجب أن يحصلوا أيضاً على الجرعة الإضافية

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.