

## السمنة تزيد احتمالات تكرار الإصابة بسرطان الثدي



إعداد: مصطفى الزعبي

وجد باحثون أن النساء اللاتي يعانين السمنة المفرطة أكثر عرضة بنسبة 18% لتكرار الإصابة بسرطان الثدي

وقال البروفيسور سيكستن هاربورج، الباحث بقسم الأورام في مستشفى جامعة آرهوس بالدنمارك: «النساء المتعافيات «يتعرضن، خاصة بعد انقطاع الطمث، لخطر متزايد لتكرار مرضهن من سرطان الثدي والسمنة

وأضاف: «إن الكيفية التي تزيد بها السمنة من خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي، ليست مفهومة تماماً بعد، لكن «المؤكد أنها تؤثر أيضاً في الاستجابة لعلاج السرطان، إذ إن السمنة تغير استقلال الدواء وتوزيعه

وحلل الباحثون بيانات 13230 ناجية من سرطان الثدي الإيجابي الهرموني وكن يتناولن مثبطات الهرمونات لمنع تكرار المرض، ومن بين هذه الحالات، كان هناك 1587 تكراراً للسرطان خلال 6 سنوات من المتابعة

وقالت د. كارمن كالفا، أخصائية أورام الثدي في مركز سيلفستر الشامل للسرطان في ميامي والمشاركة بالدراسة:  
«هناك أدلة دامغة تربط السمنة ب 13 نوعاً من السرطان، كما تزيد من خطر الوفاة بسببه

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.