

اليابان وكوريا



تشير دراسة حديثة إلى أن مرض كاواساكي ينتشر أكثر بين سكان اليابان وكوريا، وأيضاً بعض الحالات من منطقة البحر الكاريبي، وتتغير نسب الإصابة من دولة إلى أخرى، وسجلت اليابان أعلى معدل إصابة في العالم بهذا المرض، كما ارتفع معدل الإصابة داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الفترات الأخيرة، وفي دراسة سعودية جديدة استمرت 20 عاماً، تبين إصابة 8 أطفال من بين كل 100 ألف طفل بالمملكة المتحدة دون 5 سنوات، وكانت نسبة إصابة الذكور ضعف نسبة البنات، وتم التشخيص بعد 8 أيام من الإصابة بالحمى، واشتكى حوالي 3% من الأشخاص المصابين من الأعراض التقليدية للمرض، مثل التهاب الملتحمة وتضررات في الحلق وكان الطفح الجلدي هو أبرز الأعراض انتشاراً، وكشفت الدراسة إصابة ما يقرب من 53% بأمراض القلب، وحدثت تشوهات في الشرايين التاجية، كما تم علاج حوالي 36% من هؤلاء المرضى الذين يعانون مشاكل المناعة والأسبرين، وتوصلت الدراسة إلى تشابه سمات المرض في السعودية مع نفس السمات في الدول الأخرى حول العالم.